

***Halacsya sendtneri* (Boiss ) Dörfer - Halačija  
Fam : Boraginaceae ( oštroliste )**

Piše: Zoran Trogrić

***Osnovni podaci o biljci***

<b>Latinski naziv:</b>	<b><i>Halacsya sendtneri</i> (Boiss ) Dorfer - Halačija</b> <b>Fam. Boraginaceae - oštrolisti</b>
<b>Status:</b>	<b>Endemična vrsta</b>
<b>Vrijeme cvjetanja:</b>	<b>V mjesec</b>
<b>Stanište:</b>	<b>Isključivo serpentinska podloga na visini od 200 -1500 metara</b>
<b>Rasprostranjenost:</b>	<b>Endem Balkana BiH, Crna Gora i Albanija U BiH može se naći na području Žepča, Maglaja, Zavidovića, Olova i Višegrada</b>
<b>Locus classicus:</b>	<b>Okolina Maglaja 1848.g.</b>

Opis vrste: višegodišnja busenasta zeljasta biljka sa dobro razvijenim korijenom. Stabljika je uspravna do 40 cm dužine na kojoj se nalaze jednostavni, oštiri, linealno lancetasti listovi bez palističa i obrasli su sitnim dlačicama. Cvjetovi su zlatno žuti djelimično zigomorfni ( nepravilni ) i dvospolni ( **Slike 1 i 2** )




**Slika 1**

Oni su građeni od 5 međusobno sraslih lapova i čašica i 5 zlatica ( krunica ) tj. imaju dvostruko ocvjeće. Prašnika takođe ima 5 koji su srasli za cijev krunice, u središtu se nalazi jedan tučak sa nadraslom 4-gradnom plodnicom koja se nakon sazrevanja redovno raspada na 4 plodića u obliku obrašćića.

Vrijeme cvjetanja : IV – V



Slika 2



Slika 3 Stanište Halačije na području općine Žepče

Stanište : izraziti serpentinofit tj. raste na toplim padinama serpentinskog kamenjara ( **Slike 4 i 5** ) južne i jugoistočne ekspozicije od 200 - 1500 m nadmorske visine.



**Slika 4**



**Slika 5**

Opća rasprostranjenost : paleoendem ( tercijarni relikt ) BiH ( Orlovik – Žepče – **Slika 3**, Maglaj, Zavidovići, Olovo) i Srbije.

**Locus classicus:**

Kod Maglaja ( Sedenter 1848 )

Uzroci ugroženosti : kritično ugrožena zbog fragmentacije staništa i starosti populacije koja je u opadanju.