

***Euphorbia montenegrina* ( Bald ) K. Malý**

**Synonim *E. verrucosa* L.**

**Crnogorska mlječika**

**Fam : Euphorbiaceae**

**Pišer: Zoran Trogrlić**

#### Osnovni podaci o biljci

<b>Latinski naziv:</b>	<i>Euphorbia montenegrina</i> ( Bald ) K. Malý
<b>Status:</b>	<i>Endemična vrsta</i>
<b>Vrijeme cvjetanja:</b>	<i>VI, VII mjesec</i>
<b>Stanište:</b>	<i>Krečnjačka i serpentinska podloga na visini od 300 – 2000 metara</i>
<b>Rasprostranjenost:</b>	<i>Endem Balkana( BiH, Crna Gora, Albanija, Grčka )</i>
<b>Locus classicus:</b>	<i>Balj u Crnoj Gori 1900.g.</i>

Opis vrste : crnogorska mlječika je višegodišnja zeljasta biljka sa jakim odrvenjelim kroijenom, ona može narasti do 40-50 cm. Na stabljici se nalaze eliptični listovi koji su naizmjenično raspoređeni, a vrhovi listova su tupo ušiljeni sa cjelovitim rubovima. Naličje listova je obraslo sitnim dlačicama. Pricvjetni listovi su žuti, a kasnije narančasti ( **Slike 1 i 2** )




**Slika 1**





**Slika 2**

Na vrhu biljke nalaze se skupine cvjetova cijatije žute boje koje se sastoje od jednog središnjeg ženskog cvijeta koji je okružen sa 10 ili više neuredni muških cvjetova tj. cvjetovi su jednodomni. Plod je čahura 5 mm duga u kojoj se nalazi 2-3 olovno sive sjemenke.



**Slika 3** Stanište crnogorske mlječike na području općine Žepče – Orlovik

**Napomena:** Na Orloviku raste izmiješana sa, takođe endemičnom, gregersenovom mlječikom ( *Euphorbia gregersenii* K. Malý )

Vrijeme cvjetanja : V - VI - VII

Stanište : krečnjačke i serpentinski kamenjari na južnim i jugo-istočnim ekspozicijama jer je izraziti heliofit ( **slika 3** ).

Opća rasprostranjenost : subendem dinarida Crna Gora, BiH ( Žepče Orlovik ), Makedonija, Hrvatska, Srbija

Locus classicus : Crna Gora ( Baldacci A. 1900 )

Uzroci ugroženosti : uništavanje tj. gubitak staništa